

1

解答解説のページへ

$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ とおく。ただし、 i は虚数単位である。

- (1) 実数 a, b, c, d に対して $a + b\omega = c + d\omega$ が成り立つとき、 $a = c$ かつ $b = d$ であることを示せ。
- (2) 実数 x, y に対して、実数 s, t を $s + t\omega = \omega(x + y\omega)$ によって定めるとき、
$$\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
 となる 2 次の正方行列 A を求めよ。
- (3) $n = 1, 2, 3, \dots$ のとき、上の A に対して $(A^2 + E)^{3n}$ を求めよ。ただし、 E は単位行列である。

2

解答解説のページへ

不等式 $\cos 2x + cx^2 \leq 1$ がすべての x について成り立つような定数 c の値の範囲を求めよ。

3

解答解説のページへ

xy 平面上の円 $x^2 + y^2 = 1$ へ, この円の外部の点 $P(a, b)$ から 2 本の接線を引き, その接点を A, B とし, 線分 AB の中点を Q とする。

- (1) 点 Q の座標を a, b を用いて表せ。
- (2) 点 P が円 $(x-3)^2 + y^2 = 1$ の上を動くとき, 点 Q の軌跡を求めよ。

解答解説のページへ

4

 $-1 < a < 1$ とする。(1) 積分 $\int_0^a \frac{1}{1-x^2} dx$ を求めよ。(2) $n = 1, 2, 3, \dots$ のとき, 次の等式を示せ。

$$\int_0^a \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \log \frac{1+a}{1-a} - \sum_{k=0}^n \frac{a^{2k+1}}{2k+1}$$

(3) 次の等式を示せ。

$$\log \frac{1+a}{1-a} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^{2k+1}}{2k+1}$$

5

解答解説のページへ

A, B, C の 3 人が次のように勝負をくり返す。1 回目には A と B の間で硬貨投げにより勝敗を決める。2 回目以降には、直前の回の勝者と参加しなかった残りの 1 人との間で、やはり硬貨投げにより勝敗を決める。この勝負をくり返し、誰かが 2 連勝するか、または 100 回目の勝負を終えたとき、終了する。ただし、硬貨投げで勝つ確率は各々 $\frac{1}{2}$ である。

- (1) 4 回以内の勝負で A が 2 連勝する確率を求めよ。
- (2) $n = 2, 3, \dots, 100$ とする。 n 回以内の勝負で、A, B, C のうち誰かが 2 連勝する確率を求めよ。