

1

問題のページへ

$$(1) \quad y = \log x, \quad y' = \frac{1}{x} \text{ より, } l: y = \frac{1}{a}(x-a) + \log a = \frac{1}{a}x - 1 + \log a \dots\dots\dots$$

$l$  と  $x$  軸との交点は より,

$$0 = \frac{1}{a}x - 1 + \log a, \quad x = a(1 - \log a)$$


すると, 右図より,

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &= \frac{1}{2} \{ a - a(1 - \log a) \} \log a \\ &= \frac{1}{2} a (\log a)^2 \end{aligned}$$

$$S_2 = \int_1^a \log x \, dx = [x \log x - x]_1^a = a \log a - a + 1$$

$$\text{よって, } S_1 = \frac{1}{2} a (\log a)^2 - S_2 = \frac{1}{2} a (\log a)^2 - a \log a + a - 1$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{S_1}{S_2 \cdot PH} &= \frac{\frac{1}{2} a (\log a)^2 - a \log a + a - 1}{(a \log a - a + 1) \log a} \\ &= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{\log a} + \frac{1}{(\log a)^2} - \frac{1}{a(\log a)^2}}{1 - \frac{1}{\log a} + \frac{1}{a \log a}} \\ &\rightarrow \frac{1}{2} \quad (a \rightarrow \infty) \end{aligned}$$



### [ 解 説 ]

(1)は基本的な積分計算, (2)は特別な工夫が要求されない極限計算です。完答しなくてはいけない問題です。

2

問題のページへ

$n$  秒後に B, D にいる確率をそれぞれ  $b_n, d_n$  とすると,  $a_0 = 1, b_0 = c_0 = d_0 = 0$  で, また  $a_1 = c_1 = 0, b_1 = 1 - p, d_1 = p$  となる。

$$a_{n+1} = (1-p)b_n + pd_n \dots\dots\dots$$

$$b_{n+1} = (1-p)a_n + pc_n \dots\dots\dots$$

$$c_{n+1} = pb_n + (1-p)d_n \dots\dots\dots$$

$$d_{n+1} = pa_n + (1-p)c_n \dots\dots\dots$$

$$+ \text{ より, } a_{n+1} + c_{n+1} = b_n + d_n \dots\dots\dots$$

$$- \text{ より, } a_{n+1} - c_{n+1} = (1-2p)(b_n - d_n) \dots\dots\dots ' \quad \text{①}$$

$$+ \text{ より, } b_{n+1} + d_{n+1} = a_n + c_n \dots\dots\dots$$

$$- \text{ より, } b_{n+1} - d_{n+1} = (1-2p)(a_n - c_n) \dots\dots\dots ' \quad \text{②}$$

$$\text{と ①より, } a_{n+2} + c_{n+2} = a_n + c_n \dots\dots\dots$$

$$' \text{と ②より, } a_{n+2} - c_{n+2} = (1-2p)^2(a_n - c_n) \dots\dots\dots$$

(i)  $n$  が偶数のとき

$$\text{より, } a_n + c_n = a_0 + c_0 = 1$$

$$\text{より, } a_n - c_n = (a_0 - c_0)(1-2p)^{\frac{2n}{2}} = (1-2p)^n$$

$$\text{よって, } a_n = \frac{1}{2}\{1 + (1-2p)^n\}, \quad c_n = \frac{1}{2}\{1 - (1-2p)^n\}$$

(ii)  $n$  が奇数のとき


$$\text{より, } a_n + c_n = a_1 + c_1 = 0$$

$$\text{より, } a_n - c_n = (a_1 - c_1)(1-2p)^{\frac{2n-1}{2}} = 0$$

$$\text{よって, } a_n = c_n = 0$$

[ 解 説 ]


ていねいに漸化式を立てて解いてみましたが,  $n$  が奇数のときは  $a_n = c_n = 0$  であることは題意から明らかです。そのため  $n$  が偶数のときだけを考えればよいということになり, そのような解でも構いません。文系の第 2 問を参照してください。



3

問題のページへ

- (1)  $y = x^2$ ,  $y' = 2x$  から、点  $A(a, a^2)$  における接線  
 の方向ベクトルの成分は  $(1, 2a)$  とおくこと  
 ができ、これが法線の法線ベクトルとなることより、  
 法線の方程式は、



$$x - a + 2a(y - a^2) = 0$$

$$x + 2ay - a - 2a^3 = 0 \dots\dots\dots$$

が点  $P(b, k)$  を通ることより、

$$b + 2ak - a - 2a^3 = 0, \quad b = 2a^3 - (2k - 1)a \dots\dots\dots$$

- (2) 放物線においては、1本の法線に対して1個の接点に対応するので、異なる3本の法線が存在する条件は、 $b$  を  $a$  に関する方程式とみたとき、 $b$  が異なる3実数解をもつことと同値である。

の右辺を  $f(a)$  とおくと、 $f'(a) = 6a^2 - (2k - 1)$

- (i)  $2k - 1 \leq 0$  ( $k \leq \frac{1}{2}$ ) のとき

$f'(a) \geq 0$  より  $f(a)$  は単調増加するので、 $b$  が3実数解をもつことはない。

- (ii)  $2k - 1 > 0$  ( $k > \frac{1}{2}$ ) のとき

$$f'(a) = 6 \left( a + \sqrt{\frac{2k-1}{6}} \right) \left( a - \sqrt{\frac{2k-1}{6}} \right)$$

$a$	...	$-\alpha$	...	$\alpha$	...
$f'(a)$	+	0	-	0	+
$f(a)$	↗		↘		↗

となり、ここで  $\alpha = \sqrt{\frac{2k-1}{6}}$  とおくと、

が異なる3実数解をもつ条件は、 $f(\alpha) < b < f(-\alpha)$

$$f(\alpha) = \alpha(2\alpha^2 - 2k + 1) = \sqrt{\frac{2k-1}{6}} \cdot \frac{2-4k}{3} = -\frac{2k-1}{9} \sqrt{6(2k-1)}$$

$$f(-\alpha) = -\alpha(2\alpha^2 - 2k + 1) = -\sqrt{\frac{2k-1}{6}} \cdot \frac{2-4k}{3} = \frac{2k-1}{9} \sqrt{6(2k-1)}$$

よって、 $-\frac{2k-1}{9} \sqrt{6(2k-1)} < b < \frac{2k-1}{9} \sqrt{6(2k-1)}$

- (i)(ii)より、 $k > \frac{1}{2}$  のもとで  $-\frac{2k-1}{9} \sqrt{6(2k-1)} < b < \frac{2k-1}{9} \sqrt{6(2k-1)}$

[ 解 説 ]

(2)の冒頭のコメントは、一般的には「法線の本数 接点の個数」という関係があるからです。本問では、法線の法線ベクトルの成分が  $(1, 2a)$  となることから、「法線の本数 = 接点の個数」であることがわかります。

4a

問題のページへ

(1)  $n$  を整数として,(i)  $z \neq 1$  ( $\theta \neq 360^\circ \times n$ ) のとき

$$S_1 = 1 + z + z^2 + \dots + z^{N-1} = \frac{1-z^N}{1-z} = \frac{1-1}{1-z} = 0$$

(ii)  $z = 1$  ( $\theta = 360^\circ \times n$ ) のとき

$$S_1 = 1 + 1 + 1 + \dots + 1 = N$$

(2) ド・モアブルの定理から,  $z^k = \cos k\theta + i \sin k\theta$  となり,  $S_1$  の実部が  $S_2$  となる。(i)  $z \neq 1$  ( $\theta \neq 360^\circ \times n$ ) のとき

$$S_2 = 0$$

(ii)  $z = 1$  ( $\theta = 360^\circ \times n$ ) のとき

$$S_2 = N$$

(3)  $S_3 = 1 + \cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \dots + \cos^2 (N-1)\theta$ 

$$= 1 + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} + \dots + \frac{1 + \cos 2(N-1)\theta}{2}$$

$$= \frac{N}{2} + \frac{1}{2} \{1 + \cos 2\theta + \cos 4\theta + \dots + \cos 2(N-1)\theta\}$$

ここで,  $S_3' = 1 + \cos 2\theta + \cos 4\theta + \dots + \cos 2(N-1)\theta$  とすると, $S_4 = 1 + z^2 + z^4 + \dots + z^{N-1}$  の実部が  $S_3'$  となる。(i)  $z \neq \pm 1$  ( $\theta \neq 180^\circ \times n$ ) のとき

$$S_4 = \frac{1-z^{2N}}{1-z} = 0 \text{ より, } S_3 = \frac{N}{2}$$

(ii)  $z = \pm 1$  ( $\theta = 180^\circ \times n$ ) のとき

$$S_4 = N \text{ より, } S_3 = \frac{N}{2} + \frac{N}{2} = N$$

## [ 解 説 ]

(3)の解法も, (1)(2)の流れから考えると, 自然に上の解のようになると思われます。  
 (1)の誘導がなくても,  $S_2$ ,  $S_3$ はこの解法で求めるというのが受験生の常識となるでしょう。

4b

問題のページへ

$$(1) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \dots\dots\dots, y = x + k \dots\dots\dots$$

を に代入して,  $4x^2 + 9(x+k)^2 = 36$

$$13x^2 + 18kx + 9k^2 - 36 = 0 \dots\dots\dots$$

と が 2 つの共有点をもつ条件は, が異なる 2 実数解をもつことより,

$$D/4 = 9^2 k^2 - 13 \cdot 9(k^2 - 4) > 0$$

$$k^2 - 13 < 0 \text{ より, } -\sqrt{13} < k < \sqrt{13}$$

(2) P, Q の x 座標をそれぞれ  $x = p, q$  とおくと,  $p, q$  は の実数解より,

$$p + q = -\frac{18}{13}k, \quad pq = \frac{9k^2 - 36}{13} \dots\dots\dots$$

$PQ = \sqrt{2}|p - q| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(p+q)^2 - 4pq}$  から, を代入して,


$$PQ = \frac{\sqrt{2}}{13} \sqrt{18^2 k^2 - 4 \cdot 13(9k^2 - 36)} = \frac{12\sqrt{2}}{13} \sqrt{-k^2 + 13}$$

また, O から PQ に下ろした垂線の足を H とおくと,  $OH = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$  となる。

OPQ の面積を  $S$  とすると,  $S = \frac{1}{2}PQ \cdot OH$  から,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot \frac{|k|}{\sqrt{2}} \cdot \frac{12\sqrt{2}}{13} \sqrt{-k^2 + 13} = \frac{6}{13} \sqrt{-k^4 + 13k^2} \\ &= \frac{6}{13} \sqrt{-\left(k^2 - \frac{13}{2}\right)^2 + \frac{13^2}{2^2}} \end{aligned}$$

以上より,  $k^2 = \frac{13}{2}$  すなわち  $k = \pm\sqrt{\frac{13}{2}}$  のとき,  $S$  は最大値  $\frac{6}{13} \cdot \frac{13}{2} = 3$  をとる。



### [ 解 説 ]

普通に計算をしていっても上記程度の量で, さほど複雑でもありません。4a と 4b を比較すると, 難易的には同程度で, 4b の方がやや計算量が多いくらいです。なお, 選択問題に確率が出なかったのは 87 年以来, 久々のことです。