

1

問題のページへ

(1) $y = ax$ が点 P(630, 5400) を通ることより, $5400 = 630a$, $a = \frac{60}{7}$

よって, $y = \frac{60}{7}x \dots\dots\dots$

$0 < x < 630$ の範囲で, が通る格子点の x 座標は,

$$x = 7, 7 \times 2, 7 \times 3, \dots\dots, 7 \times 90$$

ここで, 一般的に曲線または直線が点 (m, n) という格子点を通るとき, $x = m$ 上の格子辺との交点と $y = n$ 上の格子辺との交点, 合わせて 2 個の交点が消滅する。

これより, 求める格子辺との交点の数は, $630 + 5400 - 90 \times 2 = 5850$

(2) $y = bx^n$ が点 P(630, 5400) を通ることより, $5400 = 630^n \cdot b$, $b = \frac{5400}{630^n}$

$$y = \frac{5400}{630^n} x^n = \frac{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2}{(2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7)^n} x^n = \frac{1}{2^{n-3} \cdot 3^{2n-3} \cdot 5^{n-2} \cdot 7^n} x^n \dots\dots\dots$$

(i) $n = 2$ のとき

は $y = \frac{2}{3 \cdot 7^2} x^2 \dots\dots\dots$ となり, x が $3 \cdot 7 = 21$ の倍数のとき y が整数となる。

$0 < x < 630$ の範囲で, が通る格子点の x 座標は,

$$x = 21, 21 \times 2, 21 \times 3, \dots\dots, 21 \times 30$$

求める格子辺との交点の数は, $630 + 5400 - 30 \times 2 = 5970$

(ii) $n = 3$ のとき

は $y = \frac{1}{3^3 \cdot 5 \cdot 7^3} x^3 \dots\dots\dots$ となり, x が $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ の倍数のとき y が整数となる。

る。

$0 < x < 630$ の範囲で, が通る格子点の x 座標は,

$$x = 105, 105 \times 2, 105 \times 3, \dots\dots, 105 \times 6$$

求める格子辺との交点の数は, $630 + 5400 - 6 \times 2 = 6018$

(iii) $n = 4$ のとき

1 $n - 3 < n$, $n < 2n - 3 < 2n$, 2 $n - 2 < n$ となることより, から x が $2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 630$ の倍数のとき y が整数となる。

$0 < x < 630$ の範囲で, が通る格子点の x 座標は, $x = 630$

求める格子辺との交点の数は, $630 + 5400 - 1 \times 2 = 6028$

[解 説]

(2)の(iii)は, 初めは $n = 4$ のときも考えて, $0 < x < 630$ では格子点を通らないことから, $n = 5, 6, \dots$ の場合も同じだろうと予測し, その理由を考えたものです。

2

問題のページへ

$f(x)$ を $x+p$ について展開し, x^n の係数 ($a_0 \neq 0$) を比較すると,

$$f(x) = a_0(x+p)^n + b_1(x+p)^{n-1} + \cdots + b_{n-1}(x+p) + b_n$$

すなわち, $f(x) = a_0(x+p)^n + \sum_{k=1}^n b_k(x+p)^{n-k}$

(i) $n \geq 2$ のとき

$$nf(x) = na_0(x+p)^n + \sum_{k=1}^n nb_k(x+p)^{n-k}$$

$$\begin{aligned} (x+p)f'(x) &= (x+p) \left\{ na_0(x+p)^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)b_k(x+p)^{n-k-1} \right\} \\ &= na_0(x+p)^n + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)b_k(x+p)^{n-k} \end{aligned}$$

条件より, $nf(x) = (x+p)f'(x)$ が恒等的に成立するので,

$$nb_k = (n-k)b_k \quad (k=1, 2, \dots, n-1) \cdots \cdots$$

$$nb_n = 0 \cdots \cdots$$

より $kb_k = 0$ なので, $1 \leq k \leq n-1$ より $b_k = 0$

より $b_n = 0$

よって, $f(x) = a_0(x+p)^n$

(ii) $n = 1$ のとき

$$f(x) = a_0(x+p) + b_1 \text{ とおくと,}$$

$$nf(x) = a_0(x+p) + b_1, \quad (x+p)f'(x) = a_0(x+p) \text{ から, 条件より } b_1 = 0$$

よって, $f(x) = a_0(x+p)$

(i)(ii)より, すべての自然数 n で $f(x) = a_0(x+p)^n$

[解 説]

少々荒っぽいのですが, 与えられた式を $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{n}{x+p}$ と変形して両辺を積分し,

$\log|f(x)| = n \log|x+p| + C = \log e^c |x+p|^n$ から, $f(x) = \pm e^c (x+p)^n$ とします。この後, x^n の係数を比較すると $f(x) = a_0(x+p)^n$ を示すことができます。

3

問題のページへ

(1) $f(x) = \log(1+a^x) - \log 2 - \frac{x}{2} \log a$ とおく。

$$f'(x) = \frac{a^x \log a}{1+a^x} - \frac{1}{2} \log a = \frac{2a^x \log a - (1+a^x) \log a}{2(1+a^x)} = \frac{(a^x - 1) \log a}{2(1+a^x)}$$

$a > 1, x > 0$ より, $f'(x) > 0$

$x = 0$ で, $f(x) = f(0) = \log(1+1) - \log 2 = 0$

また, $g(x) = \log 2 + \frac{x}{2} \log a + \frac{x^2}{8} (\log a)^2 - \log(1+a^x)$ とおく。

$$g'(x) = \frac{1}{2} \log a + \frac{x}{4} (\log a)^2 - \frac{a^x \log a}{1+a^x} = \log a \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{4} \log a - \frac{a^x}{1+a^x} \right)$$

$h(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{4} \log a - \frac{a^x}{1+a^x} = -\frac{1}{2} + \frac{x}{4} \log a + \frac{1}{1+a^x}$ とおく。

$$h'(x) = \frac{1}{4} \log a - \frac{a^x \log a}{(1+a^x)^2} = \frac{(1-a^x)^2}{4(1+a^x)^2} \log a \quad (a > 1 \text{ より})$$

$x = 0$ で, $h(x) = h(0) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+1} = 0$

$a > 1$ より, $\log a > 0$ なので $g'(x) > 0$

$x = 0$ で, $g(x) = g(0) = \log 2 - \log(1+1) = 0$

以上より, $\log 2 + \frac{x}{2} \log a > \log(1+a^x) > \log 2 + \frac{x}{2} \log a + \frac{x^2}{8} (\log a)^2$

(2) $a_n = \left(\frac{1+\sqrt[n]{3}}{2} \right)^n = \frac{(1+3^{\frac{1}{n}})^n}{2^n}$ より, $\log a_n = n \log(1+3^{\frac{1}{n}}) - n \log 2$

ここで, (1)の式において $a = 3, x = \frac{1}{n}$ とおくと,

$$\log 2 + \frac{1}{2n} \log 3 > \log(1+3^{\frac{1}{n}}) > \log 2 + \frac{1}{2n} \log 3 + \frac{1}{8n^2} (\log 3)^2$$

$$\frac{1}{2} \log 3 > n \log(1+3^{\frac{1}{n}}) - n \log 2 > \frac{1}{2} \log 3 + \frac{1}{8n} (\log 3)^2$$

$$\frac{1}{2} \log 3 > \log a_n > \frac{1}{2} \log 3 + \frac{1}{8n} (\log 3)^2$$

$n \rightarrow \infty$ とすると, はさみうちの原理より $\log a_n \rightarrow \frac{1}{2} \log 3 = \log \sqrt{3}$

対数関数は定義された変域において連続なので, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{3}$

[解 説]

(1)の不等式を誘導として用いて a_n の極限を求めるわけですが, $\log a_n$ を考えれば, $a = 3, x = \frac{1}{n}$ と対応づけるのに迷いはないでしょう。

4

問題のページへ

Q を原点とし, QP を実軸の正の部分とする複素数平面を設定する。

また, $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, $w = \cos \beta + i \sin \beta$ とおく。

すると, 点 P を表す複素数は b となり, 点 A を表す複素数は,

$$b + (0 - b) \cdot \frac{a}{b} \{ \cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha) \} = b - a \bar{z}$$

点 R, R' を表す複素数は, それぞれ $c\bar{w}$, cw となる。

点 S を表す複素数は,

$$c\bar{w} + (0 - c\bar{w}) \cdot \frac{d}{c} \{ \cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha) \} = c\bar{w} - d\bar{w}\bar{z} = \bar{w}(c - d\bar{z})$$

点 S' を表す複素数は,

$$cw + (0 - cw) \cdot \frac{d}{c} \{ \cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha) \} = cw - d\bar{w}\bar{z} = w(c - d\bar{z})$$

ここで $b - a\bar{z} = u$, $c - d\bar{z} = v$ とおくと, $A(u)$, $S(\bar{w}v)$, $S'(wv)$ となる。

$$\begin{aligned} AS^2 - AS'^2 &= |\bar{w}v - u|^2 - |wv - u|^2 \\ &= (\bar{w}v - u)(\bar{w}\bar{v} - \bar{u}) - (wv - u)(\bar{w}\bar{v} - \bar{u}) \\ &= -\bar{w}\bar{u}v - wu\bar{v} + \bar{w}u\bar{v} + wu\bar{v} = (\bar{u}v - u\bar{v})(w - \bar{w}) \end{aligned}$$

そこで, $\bar{u}v - u\bar{v} = (b - a\bar{z})(c - d\bar{z}) - (b - a\bar{z})(c - dz)$

$$\begin{aligned} &= -bd\bar{z} - acz + bdz + ac\bar{z} \\ &= (bd - ac)(z - \bar{z}) = (bd - ac) \cdot 2i \sin \alpha \end{aligned}$$

また, $w - \bar{w} = 2i \sin \beta$ より,

$$AS^2 - AS'^2 = (bd - ac)(4i^2) \sin \alpha \sin \beta = 4(ac - bd) \sin \alpha \sin \beta$$

[解 説]

昨年度の第 2 問と同じように, 新旧両課程で異なった解法の考えられる問題です。上の解では複素数平面を利用してみました。その方針さえ決まれば, 計算を簡略化するための置き換えを適当に行えば, 結論を導くことはさほど困難ではありません。過去問を演習したかどうかで差のつく問題です。

5

問題のページへ

(1) $Q(\sqrt{2} \cos \theta, \sqrt{2} \sin \theta, \sqrt{2})$, $R(\sqrt{2} \cos \varphi, \sqrt{2} \sin \varphi, -\sqrt{2})$ とおく。

$$\begin{aligned} PQ^2 &= (x - \sqrt{2} \cos \theta)^2 + (y - \sqrt{2} \sin \theta)^2 + (z - \sqrt{2})^2 \\ &= x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}(x \cos \theta + y \sin \theta) + 2 + (z - \sqrt{2})^2 \\ &= r^2 - 2\sqrt{2}r \sin(\theta + \alpha) + 2 + (z - \sqrt{2})^2 \quad \left(\sin \alpha = \frac{x}{r}, \cos \alpha = \frac{y}{r} \right) \end{aligned}$$

$\sin(\theta + \alpha) = 1$ のとき, PQ^2 は最小値 m^2 をとる。

$$m = \sqrt{r^2 - 2\sqrt{2}r + 2 + (z - \sqrt{2})^2} = \sqrt{(r - \sqrt{2})^2 + (z - \sqrt{2})^2}$$

$$\begin{aligned} PR^2 &= (x - \sqrt{2} \cos \varphi)^2 + (y - \sqrt{2} \sin \varphi)^2 + (z + \sqrt{2})^2 \\ &= r^2 - 2\sqrt{2}r \sin(\varphi + \alpha) + 2 + (z + \sqrt{2})^2 \quad \left(\sin \alpha = \frac{x}{r}, \cos \alpha = \frac{y}{r} \right) \end{aligned}$$

$\sin(\varphi + \alpha) = -1$ のとき, PR^2 は最大値 M^2 をとる。

$$M = \sqrt{r^2 + 2\sqrt{2}r + 2 + (z + \sqrt{2})^2} = \sqrt{(r + \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2}$$

(2) $|M - 2\sqrt{6}|$ m より, $(M - 2\sqrt{6})^2 \geq m^2$, $M^2 - 4\sqrt{6}M + 24 \geq m^2$
 $(r + \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 - 4\sqrt{6}M + 24 \geq (r - \sqrt{2})^2 + (z - \sqrt{2})^2$

まとめて, $r + z + 3\sqrt{2} \geq \sqrt{3}M$

$r + z + 3\sqrt{2} \geq 0$ のもとで, 両辺 2 乗すると,

$$r^2 + z^2 + 18 + 2rz + 6\sqrt{2}r + 6\sqrt{2}z \geq 3\{(r + \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2\}$$

まとめて, $r^2 - rz + z^2 - 3 \geq 0$

さてここで, $z = k$ での断面を考えると,

$$\text{は, } r + k + 3\sqrt{2} \geq 0$$

$$\text{は, } r^2 - kr + k^2 - 3 \geq 0$$

不等式 ' が解をもつのは, $k^2 - 4(k^2 - 3) \geq 0$, すなわち $-2 \leq k \leq 2$ のときである。

のもとで, $r \geq 0$ より ' はつねに満たされる。

ここで, ' の左辺を $f(r)$ とおき, $f(r) = 0$ の解を $r = r_1, r_2$ ($r_1 \leq r_2$) とおく。

(i) $f(0) \geq 0$ ($k^2 - 3 \geq 0$) のとき

$r \geq 0$ より, ' の解は $0 \leq r \leq r_2$


を考慮して, $-\sqrt{3} \leq k \leq \sqrt{3}$ のとき

$$0 \leq r \leq \frac{1}{2} \left(k + \sqrt{12 - 3k^2} \right)$$

(ii) $f(0) < 0$ ($k^2 - 3 < 0$) のとき

$r \geq 0$ より, ' の解は $k \leq r \leq r_2$

を考慮して, $\sqrt{3} \leq k \leq 2$ のとき



$$\frac{1}{2}\left(k - \sqrt{12 - 3k^2}\right) \quad r \quad \frac{1}{2}\left(k + \sqrt{12 - 3k^2}\right)$$

求める H の体積を V とし、以下のように V_1, V_2 を定めると、 $V = V_1 + V_2$

$$V_1 = \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left\{ \frac{1}{2}\left(k + \sqrt{12 - 3k^2}\right) \right\}^2 dk = \frac{2\pi}{4} \int_0^{\sqrt{3}} (k^2 + 12 - 3k^2) dk$$

$$= \pi \left[-\frac{k^3}{3} + 6k \right]_0^{\sqrt{3}} = (-\sqrt{3} + 6\sqrt{3})\pi = 5\sqrt{3}\pi$$

$$V_2 = \pi \int_{\sqrt{3}}^2 \left(\left\{ \frac{1}{2}\left(k + \sqrt{12 - 3k^2}\right) \right\}^2 - \left\{ \frac{1}{2}\left(k - \sqrt{12 - 3k^2}\right) \right\}^2 \right) dk$$

$$= \pi \int_{\sqrt{3}}^2 k\sqrt{12 - 3k^2} dk = \sqrt{3}\pi \int_1^0 (-t^2) dt = \frac{1}{3}\sqrt{3}\pi \quad (\sqrt{4 - k^2} = t \text{ とおく})$$

$$\text{以上より、} V = 5\sqrt{3}\pi + \frac{1}{3}\sqrt{3}\pi = \frac{16}{3}\sqrt{3}\pi$$

[解 説]

本年度の 5 題中で最難問です。(1)は図形的に考えてもできますが、上の解では座標を用いてみました。計算はそんなに複雑ではありません。(2)では、平面 $z = k$ での切り口を考え、その断面積を求めて積分するという普通の方法をとりました。計算量はかなり多く、しかも無理不等式の同値変形など必要で、神経を消耗するものでした。ところが先日、月刊誌『大学への数学』4月号を見ていたところ、(2)の体積を円筒分割(いわゆるバウムクーヘン型求積法)で求める解法が載っていました。この方法の方がはるかに簡明でした。反省です。

なお、この円筒分割による求積法は、一部の教科書(東京書籍版)には載っていませんので、説明なしに使っても差し支えないと思えます。