

1

問題のページへ

$$y = 2\sqrt{3}(x - \cos\theta)^2 + \sin\theta \dots\dots, \quad y = -2\sqrt{3}(x + \cos\theta)^2 - \sin\theta \dots\dots \quad \text{に対して,}$$

$$2\sqrt{3}(x - \cos\theta)^2 + \sin\theta = -2\sqrt{3}(x + \cos\theta)^2 - \sin\theta$$

$$4\sqrt{3}x^2 + 4\sqrt{3}\cos^2\theta + 2\sin\theta = 0 \dots\dots\dots$$

と が相異なる 2 点で交わる条件は, が異なる 2 実数解をもつことなので,

$$D/4 = -4\sqrt{3}(4\sqrt{3}\cos^2\theta + 2\sin\theta) > 0, \quad 2\sqrt{3}(1 - \sin^2\theta) + \sin\theta < 0$$

$$2\sqrt{3}\sin^2\theta - \sin\theta - 2\sqrt{3} > 0, \quad (\sqrt{3}\sin\theta - 2)(2\sin\theta + \sqrt{3}) > 0$$

$$\sqrt{3}\sin\theta - 2 < 0 \text{ より, } 2\sin\theta + \sqrt{3} < 0, \quad \sin\theta < -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{よって, } n \text{ を整数として, } 2n\pi + \frac{4}{3}\pi < \theta < 2n\pi + \frac{5}{3}\pi$$

## [ 解 説 ]

あまりにも簡単すぎて不気味です。

2

問題のページへ

(1)  $x^{n+1}$  を  $x^2 - x - 1$  で割った商を  $q(x)$  とすると、条件より、

$$x^{n+1} = (x^2 - x - 1)q(x) + a_n x + b_n$$

すると、 $x^{n+2} = (x^2 - x - 1)xq(x) + a_n x^2 + b_n x$

$$= (x^2 - x - 1)xq(x) + a_n(x^2 - x - 1) + a_n x + a_n + b_n x$$

$$= (x^2 - x - 1)\{xq(x) + a_n\} + (a_n + b_n)x + a_n$$

$x^{n+2}$  を  $x^2 - x - 1$  で割った余りが  $a_{n+1}x + b_{n+1}$  なので、

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n$$

(2)  $a_n, b_n$  がともに正の整数で、互いに素であることを数学的帰納法で示す。

(i)  $n = 1$  のとき

$$x^2 = (x^2 - x - 1) \cdot 1 + x + 1 \text{ より, } a_1 = b_1 = 1 \text{ となり, } a_1, b_1 \text{ はともに正の整数で,}$$

互いに素である。

(ii)  $n = k$  のとき

$a_k, b_k$  がともに正の整数で、互いに素であると仮定する。

(1)より、 $a_{k+1} = a_k + b_k, b_{k+1} = a_k$  なので、 $a_{k+1}, b_{k+1}$  はともに正の整数である。

ここで、 $a_{k+1}, b_{k+1}$  に 2 以上の公約数が存在するとしたとき、

$$a_k = b_{k+1}, \quad b_k = a_{k+1} - a_k = a_{k+1} - b_{k+1}$$

これより、 $a_k, b_k$  にも 2 以上の公約数が存在することになり、 $a_k, b_k$  が互いに素であることに反する。

よって、 $a_{k+1}, b_{k+1}$  は互いに素である。

(i)(ii)より、 $a_n, b_n$  はともに正の整数で、互いに素である。

### [ 解 説 ]

互いに素であることの証明も、最大公約数を設定してゴチャゴチャ計算するまでもありませんでした。

3

問題のページへ

原点を中心とし、点  $A(0, 0, -1)$  を通る球面  $S$  の方程式は、

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \dots\dots\dots$$

点  $P(x_0, y_0, z_0)$  としたとき、 $OP$  を直径とする球面の方程式は、

$$x(x - x_0) + y(y - y_0) + z(z - z_0) = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - x_0x - y_0y - z_0z = 0 \dots\dots\dots$$

の交線である円を含む平面  $L$  は、 - より、

$$x_0x + y_0y + z_0z - 1 = 0$$

すると、 $PQ = \frac{|x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 1|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}$ ,  $AR = \frac{|-z_0 - 1|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}$

条件より、 $PQ \geq AR$  なので、 $|x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 1| \geq |-z_0 - 1|$

$$(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 1)^2 - (-z_0 - 1)^2 \geq 0$$


$$(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - z_0 - 2)(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 + z_0) \geq 0$$

すると、点  $P(x_0, y_0, z_0)$  の動く範囲を表す不等式は

$$(x^2 + y^2 + z^2 - z - 2)(x^2 + y^2 + z^2 + z) \geq 0$$

$$\left\{x^2 + y^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right\} \left\{x^2 + y^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right\} \geq 0$$

したがって、点  $P$  の動く範囲  $V$  は、球面  $S$  の外側で、点  $(0, 0, \frac{1}{2})$  を中心とする半径  $\frac{3}{2}$  の球から、点  $(0, 0, -\frac{1}{2})$  を中心とする半径  $\frac{1}{2}$  の球を取り除いたものである。 $xz$  平面による断面は右図の網点部となり、これを利用すると、 $V$  の体積は、



$$\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 - \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{19}{6}\pi < \frac{19}{6} \times 3.15 = 9.975 < 10$$

[ 解 説 ]

もうすぐ旧旧課程となってしまいますが、空間図形の方程式を利用して解きました。これが普通の解法だと思うのですが。

4

問題のページへ

$$y = \frac{x^2}{x^2 + 1} \text{ より, } y' = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

点  $Q(t, \frac{t^2}{t^2 + 1}) (t \neq 0)$  とおくと、 $Q$  における接線の傾きが

$$y' = \frac{2t}{(t^2 + 1)^2} \text{ より, 点 } Q \text{ における法線は,}$$

$$y - \frac{t^2}{t^2 + 1} = -\frac{(t^2 + 1)^2}{2t}(x - t)$$


条件より、点  $P(0, a)$  を通るので、 $a - \frac{t^2}{t^2 + 1} = -\frac{(t^2 + 1)^2}{2t}(-t)$

$$a = \frac{t^2}{t^2 + 1} + \frac{(t^2 + 1)^2}{2} \dots\dots\dots (*)$$

ここで、 $f(t) = \frac{t^2}{t^2 + 1} + \frac{(t^2 + 1)^2}{2}$  とおくと、

$$f'(t) = \frac{2t}{(t^2 + 1)^2} + (t^2 + 1) \cdot 2t = \frac{2t\{1 + (t^2 + 1)^3\}}{(t^2 + 1)^2}$$

右表より、 $(*)$  が  $t \neq 0$  の解をもつ条件は  $a > \frac{1}{2}$  である。



$t$	...	0	...
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$	↘	$\frac{1}{2}$	↗

[ 解 説 ]

難しそうな感じのする設問ですが、法線の  $y$  切片の存在範囲を求める問題と題意を翻訳できれば、簡単です。

5

問題のページへ

$P_k\left(\frac{k}{n}, 1-\frac{k}{n}, 0\right)$ ,  $P_{k+1}\left(\frac{k+1}{n}, 1-\frac{k+1}{n}, 0\right)$  に対して,  
 $Q_k(0, 0, z_k)$  とおくと, 条件より,  $P_k Q_k = 1$  なので,

$$\left(\frac{k}{n}\right)^2 + \left(1-\frac{k}{n}\right)^2 + z_k^2 = 1, \quad z_k^2 = 2 \cdot \frac{k}{n} - 2\left(\frac{k}{n}\right)^2$$

$$z_k \geq 0 \text{ より, } z_k = \sqrt{2 \cdot \frac{k}{n} - 2\left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{さて, } OP_k P_{k+1} &= \frac{1}{2} \left| \frac{k}{n} \left(1 - \frac{k+1}{n}\right) - \frac{k+1}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \frac{k}{n} - \frac{k(k+1)}{n^2} - \frac{k+1}{n} + \frac{k(k+1)}{n^2} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \frac{-1}{n} \right| = \frac{1}{2n} \end{aligned}$$

$$\text{すると, } V_k = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2n} \sqrt{2 \cdot \frac{k}{n} - 2\left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{1}{n} \sqrt{\frac{k}{n} - \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} V_k = \frac{\sqrt{2}}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{\frac{k}{n} - \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{6} \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx$$


ここで,  $I = \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{-\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{1 - 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2} dx$  から,  
 $2\left(x - \frac{1}{2}\right) = \sin \theta \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$  とおくと,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cdot \frac{1}{2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{8} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{8} \pi \end{aligned}$$

$$\text{以上より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} V_k = \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{1}{8} \pi = \frac{\sqrt{2}}{48} \pi$$

## [ 解 説 ]

区分求積法を利用して, 級数の和を求める基本問題です。



6

問題のページへ

- (1) 数列  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  は、1 回シャッフルすると、  
 $\{5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4\}$   
 2 回シャッフルすると、 $\{7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2\}$   
 3 回シャッフルすると、 $\{8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$
- (2) 数列  $\{1, 2, 3, \dots, N, N+1, N+2, N+3, \dots, 2N\}$  をシャッフルすると、  
 $\{N+1, 1, N+2, 2, N+3, 3, \dots, 2N, N\}$  となる。

1  $k$   $N$  に対して、数列前半  $\{1, 2, 3, \dots, N\}$  の  $k$  番目の数は、シャッフルすると  $2k$  番目になるので、 $f(k) = 2k$  である。

よって、 $f(k) - 2k = 0$  となり、 $2N+1$  で割り切れる。

$N+1$   $k$   $2N$  に対して、数列後半  $\{N+1, N+2, N+3, \dots, 2N\}$  の  $k-N$  番目の数は、シャッフルすると  $2(k-N)-1$  番目になるので、 $f(k) = 2(k-N)-1$  である。

よって、 $f(k) - 2k = -2N - 1$  となり、 $2N+1$  で割り切れる。

- (3) (2) より、 $f(k)$  と  $2k$  は  $2N+1$  で割ったとき余りが等しくなるので、これを次のように表す。

$$f(k) \equiv 2k \pmod{2N+1}$$

さて、 $N = 2^{n-1}$  のとき、数列  $\{1, 2, 3, \dots, 2^n\}$  を 1 回シャッフルすると、

1  $k$   $2^n$  を満たす任意の  $k$  に対して、

$$f(k) \equiv 2k \pmod{2^n + 1}$$

2 回シャッフルすると、

$$f(f(k)) \equiv f(2k) \equiv 2(2k) = 2^2 k \pmod{2^n + 1}$$

3 回シャッフルすると、

$$f(f(f(k))) \equiv f(2^2 k) \equiv 2(2^2 k) = 2^3 k \pmod{2^n + 1}$$

同様にして、 $2n$  回シャッフルしたとき、 $f^{2n}(k)$  と表すと、

$$f^{2n}(k) \equiv 2^{2n} k \pmod{2^n + 1}$$

ここで、 $2^{2n} k - k = (2^n + 1)(2^n - 1)k$  となるので、 $2^{2n} k - k \equiv 0 \pmod{2^n + 1}$

したがって、 $f^{2n}(k) \equiv k \pmod{2^n + 1}$  となり、1  $k$   $2^n$  から  $f^{2n}(k) = k$  である。すなわち、数列  $\{1, 2, 3, \dots, 2^n\}$  は  $2n$  回シャッフルするとともにもどる。

### [ 解 説 ]

1 から  $2^n$  までの数に対して、 $2^n + 1$  で割った余りに注目するところが、(3) のポイントです。(2) がその誘導となっています。